ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СПУТНИКА SMOS ДЛЯ АНАЛИЗА ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА АРКТИЧЕСКИХ АКВАТОРИЙ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

Тихонов В.В.

Институт космических исследований РАН, г. Москва
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
г. Санкт-Петербург

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАЮЩИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ПОПАДАНИЯ В ПИКСЕЛЬ РАДИОМЕТРА УЧАСТКОВ СУШИ

НА ПРИМЕРЕ ЕНИСЕЙСКОГО ЗАЛИВА И ДАННЫХ СПУТНИКА SMOS

Тихонов В.В.^{1,2,3}, Хвостов И.В.², Романов А.Н.², Шарков Е.А.¹

¹Институт космических исследований РАН, г. Москва

²Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
г. Санкт-Петербург

ДАНИЕ

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – 2009 — наст. вр. MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis)

(a)

(b)

$$f = 1.4 (H, V) \text{ ГГц}$$
$$\theta = 10 \dots 60^\circ$$

ДАННЫЕ

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – 2009 — наст. вр.
MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis)

Продукт SMOS L1C

$$f = 1.4 \text{ (H, V) ГГц}$$
$$\theta = 42.5^\circ$$

Пиксель 35x65 км

$$S_{\Pi} = 1780 \text{ км}^2 \text{ (3 дБ)} \sim 9 \text{ яч.}$$

Дискретная геодезическая сетка DGG ISEA 4H9

$$l_{\text{Я}} = 16 \text{ км}, S_{\text{Я}} = 195 \text{ км}^2$$

ОБСКАЯ ГУБА

зима

0 %
5 %

ОБСКАЯ ГУБА

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Ячейка	Доля площади суши в конусе ДНА по уровню 3db	
	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

МОДЕЛЬ

$$T_{MIRAS}^{h,v} = T_{Surf}^{h,v} \exp(-\xi_{\theta}) + T_a + R_{Surf}^{h,v} T_a \exp(-\xi_{\theta}) + R_{Surf}^{h,v} T_{cos} \exp(-2\xi_{\theta}),$$

$$T_{Br}^{h,v} = k T_{MIRAS\ Coast}^{h,v} + (1-k) T_{MIRAS\ Cell}^{h,v}$$

Ячейка	Доля площади суши в конусе ДНА по уровню 3db	
	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

Относительная удельная площадь, занятая прибрежной территорией

МОДЕЛЬ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ АКВАТОРИИ

$$T_{MIRAS}^{h,v} = T_{Surf}^{h,v} \exp(-\xi_{\theta}) + T_a + R_{Surf}^{h,v} T_a \exp(-\xi_{\theta}) + R_{Surf}^{h,v} T_{cos} \exp(-2\xi_{\theta}),$$

$$T_{SurfCell}^v = \sum_{j=1}^3 \frac{T_j |W_j|^2}{|1 - r_j^- r_j^+ \exp(2i\psi_j)|^2} \times [(1 - \exp(-2\text{Im}\psi_j)) (1 + |r_j^- \exp(i\psi_j)|^2)] +$$

$$+ 4 \frac{\text{Im}\psi_j}{\text{Re}\psi_j} \text{Re}(r_j^- \exp(i\psi_j)) \text{Im}(\exp(i\psi_j)) \times \left[\frac{|k_{zj}|^2 - k_x^2}{|k_j|^2} \right] \frac{\text{Re}Z_j}{\text{Re}Z_0} + T_4 |W_4|^2 \frac{\text{Re}Z_4}{\text{Re}Z_0}$$

$$T_{SurfCell}^h = \sum_{j=1}^3 \frac{T_j |W_j|^2}{|1 - r_j^- r_j^+ \exp(2i\psi_j)|^2} \times [(1 - \exp(-2\text{Im}\psi_j)) (1 + |r_j^- \exp(i\psi_j)|^2)] +$$

$$+ 4 \frac{\text{Im}\psi_j}{\text{Re}\psi_j} \text{Re}(r_j^- \exp(i\psi_j)) \text{Im}(\exp(i\psi_j)) \left[\frac{\text{Re}Z_j}{\text{Re}Z_0} + T_4 |W_4|^2 \frac{\text{Re}Z_4}{\text{Re}Z_0} \right]$$

$$W_j = \prod_{m=1}^j \frac{Z_{m-1}^{in+} + Z_{m-1}}{Z_{m-1}^{in+} + Z_m} \exp(i\psi_{m-1}), \quad Z_j^{in+} = Z_j \frac{Z_{j-1}^{in+} - iZ_j \text{tg}\psi_j}{Z_j - iZ_{j-1}^{in+} \text{tg}\psi_j}, \quad Z_j^{in-} = Z_j \frac{Z_{j+1}^{in-} - iZ_j \text{tg}\psi_j}{Z_j - iZ_{j+1}^{in-} \text{tg}\psi_j}$$

$$\psi_j = k_{zj} h_j, \quad k_{zj} = k_j \cos \theta_j, \quad k_x = k_0 \sin \theta_0, \quad k_j = \frac{2\pi \sqrt{\varepsilon_j}}{\lambda}, \quad \cos \theta_j = \sqrt{\frac{\varepsilon_j - \varepsilon_0 \sin^2 \theta_0}{\varepsilon_j}}$$

$$r_j^+ = \frac{Z_{j-1}^{in+} - Z_j}{Z_{j-1}^{in+} + Z_j}, \quad r_j^- = \frac{Z_{j+1}^{in-} - Z_j}{Z_{j+1}^{in-} + Z_j}, \quad Z_j = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_j} \cos \theta_j} & \text{— горизонтальная поляризация} \\ \frac{\cos \theta_j}{\sqrt{\varepsilon_j}} & \text{— вертикальная поляризация} \end{cases}$$

МОДЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ

$$\varepsilon_{\text{эфф}}^{\text{лед}} = \varepsilon_{\text{лед}} \left[1 - \frac{4\pi n_{\text{возд}} (\varepsilon_{\text{возд}} + 2\varepsilon_{\text{лед}}) \frac{\langle f_{\omega} \rangle_{\text{возд}}}{k^2}}{2\varepsilon_{\text{эфф}} + \varepsilon_{\text{возд}}} - \frac{4\pi n_{\text{жидк}} (\varepsilon_{\text{жидк}} + 2\varepsilon_{\text{лед}}) \frac{\langle f_{\omega} \rangle_{\text{жидк}}}{k^2}}{2\varepsilon_{\text{эфф}} + \varepsilon_{\text{жидк}}} \right]^{-1}$$

$$\varepsilon_{\text{эфф}}^{\text{снег}} = \varepsilon_{\text{возд}} \left[1 - \frac{4\pi n_{\text{лед}} (\varepsilon_{\text{вода}} + 2\varepsilon_{\text{возд}}) \frac{\langle f_{\omega} \rangle_{\text{лед}}}{k^2}}{2\varepsilon_{\text{эфф}} + \varepsilon_{\text{лед}}} - \frac{4\pi n_{\text{вода}} (\varepsilon_{\text{вода}} + 2\varepsilon_{\text{лед}}) \frac{\langle f_{\omega} \rangle_{\text{вода}}}{k^2}}{2\varepsilon_{\text{эфф}} + \varepsilon_{\text{вода}}} \right]^{-1}$$

МОДЕЛЬ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕРЕГА

МОДЕЛЬ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕРЕГА

МОДЕЛЬ ЯРКОСТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕРЕГА

$$T_{MIRAS}^{h,v} = T_{Surf}^{h,v} \exp(-\xi_{\theta}) + T_a + R_{Surf}^{h,v} T_a \exp(-\xi_{\theta}) + R_{Surf}^{h,v} T_{cos} \exp(-2\xi_{\theta}),$$

$$T_{Surf\ Coast}^{h,v} = x^{h,v} T$$

Сезон	Коэффициент излучения 42,5°	
	v	h
Лето/Осень	0,86	0,75
Зима	0,97	0,88
Весна	0,75	0,65
Оттепель	0,93	0,78

Суша – 0%

ОБСКАЯ ГУБА

Суша – 10%

зима 5%

МОДЕЛЬ (зима-лето)

лето $\chi_{\text{берег}} > \chi_{\text{акватория}}$
 зима $\chi_{\text{берег}} \sim \chi_{\text{акватория}}$

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Зима - 0 %

Суша - 44%

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Зима – 5-15 %

Суша – 12%

Фронтальная зона зимой
Transition zone in winter

N73°45'

Доля площади суши в конусе ДНА по уровню 3db

Ячейка	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Зима – 10-15 % Суша – 20%

N73°45'

Доля площади суши в конусе ДНА ка по уровню 3db

	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

N70°15'

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Зима – 25 %

Суша – 20%

Ячейка	Доля площади суши в конусе ДНА по уровню 3db	
	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Зима – 25 %

Суша – 0%

Ячейка	Доля площади суши в конусе ДНА по уровню 3db	
	min	max
E01	0,38	0,46
E02	0,00	0,12
E03	0,07	0,38
E04	0,00	0,21
E05	0,07	0,40
E06	0,02	0,25
E07	0,00	0,08
E08	0,00	0,00
E09	0,00	0,01
E10	0,00	0,01
E11	0,00	0,00
E12	0,00	0,23

АНАЛИЗ СПЛОЧЕННОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В КАРСКОМ МОРЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКА SMOS ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

*Тихонов В.В.^{1,2,3}, Алексеева Т.А.^{3,1}, Афанасьева Е.В.^{3,1},
Соколова Ю.В.^{3,1}, Хвостов И.В.², Романов А.Н.²*

¹Институт космических исследований РАН, г. Москва

²Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул

³Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
г. Санкт-Петербург

ДАНИЕ

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) – 2009 — наст. вр. MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis)

(a)

(b)

Продукт SMOS L1C

$$f = 1.4 \text{ (H, V) ГГц}$$

$$\theta = 42.5^\circ$$

ГЛУБИНА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ

$$h_{PD} = \frac{\lambda}{4\pi \operatorname{Im}(\sqrt{\epsilon})}$$

Пресноводный лёд, $t = -20\text{ }^\circ\text{C}$

Пресноводный лёд, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

Сухой снег, $t = -20\text{ }^\circ\text{C}$

Озёрный лёд, $t = -20\text{ }^\circ\text{C}$

Озёрный лёд, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

Морской лёд, $t = -20\text{ }^\circ\text{C}$

Морской лёд, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

Влажный снег, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

Пресная вода, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

Морская вода, $t = 0\text{ }^\circ\text{C}$

ЭСТУАРИИ АРКТИКИ. ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

ЭСТУАРИИ АРКТИКИ. ЕНИСЕЙСКИЙ ЗАЛИВ

Динамичная зона:
льды взламываются,
новые льды, ветер ↑↓

Карелин И. Д., Карклин В. П. Припай и заприпайные полыньи арктических морей сибирского шельфа в конце XX - начале XXI века. СПб: ААНИИ, 2012. 180 с.

ЭСТУАРИИ АРКТИКИ. ХАТАНГСКИЙ ЗАЛИВ

ДААННЫЕ ПО СПЛОЧЕННОСТИ ЛЬДА

MODIS Terra

ААНИИ

Sentinel-1

MODIS

Разрешение – 250 м

Band 1: 0,62 – 0,67 мкм

Band 4: 0,545 – 0,565 мкм

Band 3: 0,459 – 0,479 мкм

Sentinel-1

Разрешение – 300 м

C-band (5,405 ГГц)

ДААННЫЕ О СПЛОЧЕННОСТИ ЛЬДА

74° с.ш., 76° в.д.

СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА

однолетние льды

T_H : 204 К – 233 К

T_V : 235 К – 254 К

T_H/T_V : 0,85 – 0,95

полынья

$T_H \rightarrow 115$ К

$T_V \rightarrow 164$ К

$T_H/T_V \rightarrow 0,7$

однолетние льды, нилас

T_H : 196 К – 240 К

T_V : 224 К – 260 К

T_H/T_V : 0,85 – 0,94

процесс таяния

T_H : 225 К $\rightarrow$ 90 К

T_V : 250 К $\rightarrow$ 135 К

T_H/T_V : 0,9 $\rightarrow$ 0,65

закрытие полыньи

начальные формы льда

однолетние льды с севера

СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА

однолетний лед	с → однолетний лед	однолетний лед	однолетний лед юз → полынья
T_H : 212 К – 230 К	T_H : 214 К – 227 К	T_H : 219 К – 234 К	T_H : 215 К – 233 К $T_H \rightarrow 110$ К
T_V : 243 К – 252 К	T_V : 243 К – 250 К	T_V : 245 К – 257 К	T_V : 240 К – 254 К $T_V \rightarrow 150$ К
T_H/T_V : 0,85 – 0,92	T_H/T_V : 0,85 – 0,92	T_H/T_V : 0,87 – 0,93	T_H/T_V : 0,89 – 0,93 $T_H/T_V \rightarrow 0,74$
полынья → <u>нилас</u> → серый лед	однолетний лед → <u>нилас</u>	однолетний лед	однолетний лед
св → ол 9-10 баллов, $T_H \rightarrow 186$ К	$T_H \rightarrow 123$ К, $T_V \rightarrow 163$ К,	T_H : 155 К – 205 К,	T_V : 195 К – 233 К, T_H/T_V : 0,81 – 0,9
$T_V \rightarrow 230$ К, $T_H/T_V \rightarrow 0,81$	$T_H/T_V \rightarrow 0,71$		

ВЫВОДЫ

Данные радиометра MIRAS спутника SMOS:

1. $T_{\text{я}}$ – очень чувствительна к изменениям состояния морского льда (таяние, замерзание, начальные формы льда, однолетний лед).
2. $T_{\text{я}}$ – хорошо коррелирует со сплоченностью ледяного покрова.
3. $T_{\text{H}}/T_{\text{V}}$ – хорошо коррелирует со сплоченностью ледяного покрова.
4. $T_{\text{я}}$ и $T_{\text{H}}/T_{\text{V}}$ – «видят» начальные формы льда.
5. MIRAS → AMSR2, SSMIS, МТВЗА-ГЯ → Алгоритм

Спасибо!

Thanks!