Первое детектирование гамма-излучения радиоактивного ^{56}Co от сверхновой типа Ia (SN2014J) обсерваторией ИНТЕГРАЛ.

Е.Чуразов, Р.Сюняев, Дж.Изерн, Ю.Кнедлседер, П.Жан, Ф.Лебран, Н.Чугай, С.Гребенев, Э.Браво, С.Сазонов, М.Рено

Эволюция звезд разной массы

Ближайшие сверхновые в космическую эру (+ гамма-обсерватория в космосе)

Сверхновая типа II : SN1987A в LMC

Сверхновая типа Ia : SN2014J в M82

SN1987A типа II в Большом Магеллановом Облаке

Letters to Nature

Nature **330**, 227-229 (19 November 1987) | doi:10.1038/330227a0; Accepted

Discovery of hard X-ray emission from supernova 1987A

R. Sunyaev*, A. Kaniovsky*, V. Efremov*, M. Gilfanov*, E. Churazov*, S. Grebenev*, A. Kuznetsov*, A. Melioranskiy*, N. Yamburenko*, S. Yunin*, D. Stepanov*, I. Chulkov*, N. Pappe*, M. Boyarskiy*, E. Gavrilova*, V. Loznikov*, A. Prudkoglyad*, V. Rodin*, C. Reppin[†], W. Pietsch[†], J. Engelhauser[†], J. Trümper[†], W. Voges[†], E. Kendziorra[†], M. Bezler[†], R. Staubert[†], A. C. Brinkman[§], J. Heise[§], W. A. Mels[§], R. Jager[§], G. K. Skinner^{||}, O. Al-Emam^{||}, T. G. Patterson^{||} & A. P. Willmore^{||}

- *Space Research Institute, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR
- [†]Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Institut für Extraterrestrische Physik, 8046 Garching, FRG
- [‡]Astronomisches Institut der Universität Tübingen, 7400 Tübingen, FRG
- [§]Space Research Laboratory, Utrecht, The Netherlands
- ^{||}Department of Space Research, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK

We report the discovery of hard X-rays from the region of the supernova SN1987A in the Large Magellanic Cloud. The observations were made from the Mir-Kvant observatory

'Röntgen' Hard X-rays were first observed on 10 August 1987

▲ Top

Сверхновая типа II: коллапс ядра массивной (20 масс Солнца) звезды.

Cobalt-56 γ -ray emission lines from the type Ia supernova 2014J

E. Churazov^{1,2}, R. Sunyaev^{1,2}, J. Isern³, J. Knödseder^{4,5}, P. Jean^{4,5}, F. Lebrun⁶, N. Chugai⁷, S. Grebenev¹, E. Bravo⁸, S. Sazonov^{1,9} & M. Renaud¹⁰

A type Ia supernova is thought to be a thermonuclear explosion of either a single carbon-oxygen white dwarf or a pair of merging white dwarfs. The explosion fuses a large amount of radioactive ⁵⁶Ni (refs 1-3). After the explosion, the decay chain from ⁵⁶Ni to ⁵⁶Co to

The spect in the 1,038 show of the IBIS

SN2014J типа Ia в галактике M82

21 января 2014, Steve Fossey, UCL

Дата взрыва: 14 января 2014

M82 (Сигара)

Расстояние до M82

3.5 Мпк – 11 млн.световых лет

Сверхновая типа Ia

Величина: 10.5 в пике

Поглощение: 1.7-2 величины

Первый шанс зарегистрировать сверхновую типа Ia в гамма-диапазоне

Почему для гамма диапазона нужна близкая сверхновая?

Как часто взрываются сверхновые Ia?

Раз в 100-200 лет в нашей Галактике

SN1604A	<6 крс - в нашей Галактике [времена Бориса Годунова]
SN1972E	3.6 Мрс
SN1986G	3.7 Мрс
SN2011fe	6.4 Мрс
SN2014J	3.3-3.5 Мрс

ГАЛАКТИКА
В АНДРОМЕДЕ

ГАЛАКТИКА
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

205

145

185

М32

1 Мпк

1613

Дракон М. Медведица

Пегас

Б. Медведица

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Печь

Скульптор

Секстан

Лев II

Лев I

ММО

БМО

Масса звезд внутри сферы с заданным R: $M(<R)$

1 за 25 лет

(using catalog of local galaxies from Karachentsev's sample)

Наша Галактика: ~1 SNIa в столетие

Белый карлик = Конечная стадия эволюции звезд с массой $M < 8$ масс Солнца

Радиус $\sim 10\,000$ км
Масса ~ 0.5 масс Солнца
Углерод+Кислород

Белый карлик поддерживается давлением вырожденного электронного газа.

Максимальная масса $\sim 1.4 M_{\text{sun}}$ – предел Чандрасекара

Предел Чандрасекара

$$\Delta p \Delta x \sim \hbar$$

$$\Delta x \propto \rho^{-1/3}$$

Что произойдет с белым карликом, если его масса превысит предел Чандрасекара?

Белый карлик

$+\Delta M$

Нейтронная
Звезда (10 км)

Термоядерный
взрыв : SNIa

$C, O \rightarrow Si, Ca, Ni$
0.6-0.8 МэВ/нуклон
Скорость $\sim 10^4$ км/с

Рост массы белого карлика

WD+ ΔM

Whelan & Iben 1974

WD+WD

Iben & Tutukov 1984

Webbink 1984

DD'

Kushnir et al., 2013

Горение C+O в белых карликах

1. Что поджигает?
приближение к M_{Ch}
столкновение + ударные
взрыв на поверхности
2. Режим горения?
Дефлаграция
Детонация
Дефлаграция+детонация

Энергия связи на один нуклон

Почему мы видим сверхновые после взрыва?

1. Прямое гамма-излучение
2. Переработанное излучение (оптический диапазон)

$$\tau \propto t^{-2}$$

-10 дней

0

10 дней
Оптика

100 дней
γ-излучение

442 лет
Рентгеновское излучение

INTEGRAL
ESA+Roscosmos+NASA

Chandra
NASA/CXC/SAO

Три элемента из стандартной физики

- 1) Предел Чандрасекара $\rightarrow 1.4 M_{\text{sun}}$
 - 2) Синтез C,O в Ni $\rightarrow 0.6-0.8$ МэВ/нуклон
 - 3) Распад Ni,Co $\rightarrow$ неск. МэВ на ядро
-
- 1) Оптическая толщина
 - 2) Скорость разлета
 - 3) Масса Ni и поток в линиях

Международная обсерватория ИНТЕГРАЛ (ИКИ, КГУ, ГАИШ, ФТИ, ИПФ, МФТИ...)

17 окт. 2002

ЕКА+Россия+НАСА

**25% времени принадлежит
российским ученым**

**Диапазон энергий : 20 кэВ – 8 МэВ
Угловое разрешение: 10'-2 град.
Энерг. Разрешение : $E/\Delta E \sim 600$ @ 1 МэВ**

Маска из вольфрама

INTEGRAL/SPI

Разрешение: ~ 2 кэВ @ 511 кэВ

Площадь: ~ 70 см²

Нет фокусирующих телескопов на энергиях $> 80 \text{ keV}$

Mask

Detector

Image

ISGRI/INTEGRAL

Крабовидная туманность «сквозь маску»

Эволюция массы Ni и Co: $^{56}\text{Ni} \rightarrow ^{56}\text{Co} \rightarrow ^{56}\text{Fe}$

M82 до и после вспышки SN2014J (100-600 кэВ)

До

После

3.7 σ

Изображения в узких полосах вблизи линий ^{56}Co

3.9σ

4.43σ

Распад $^{56}\text{Co} \rightarrow ^{56}\text{Fe}$

Гомологичное расширение
Полное перемешивание
Экспоненциальный профиль

Модель ЗРАР

$$r = vt$$

58% - Ni,Co,Fe

21% - Si

21% - S

$$\rho \propto e^{-v/V_e}$$

Dwarkadas & Chevalier 1998

$$M_{Ni}, M_{Ejecta}, V_e$$

$$V_e = \sqrt{\frac{E_K}{6M_{Ejecta}}}$$

Взаимодействие гамма-квантов с оболочкой

Фотопоглощение
(ионизация)

Когерентное рассеяние

Некогерентное рассеяние
(ионизация)

$$\tau \propto t^{-2}$$

Судьба позитронов (19% распадов)

Средняя начальная энергия ~630 кэВ

1) Позитрон замедляется

2) Захватывает электрон и формирует атом «позитрония»

Типичный выходящий спектр (модель)

77% of energy escapes in gamma-rays

Линии 847 и 1238 кэВ на 75-ый день

Parameter	847 keV line	1238 keV line
Flux, 10^{-4} phot cm $^{-2}$ s $^{-1}$	2.34±0.74	2.78±0.74
Luminosity, 10^{41} erg s $^{-1}$	4.7	8.1
V_{shift} (l.o.s. velocity), km s $^{-1}$	-1900±1600	-4300±1600
Line width (l.o.s. velocity rms), σ_v , km s $^{-1}$	3600±1300	4700±1400

На этот момент:

77% гамма-излучения уходит из оболочки

23% + кинетическая энергия позитронов → нагрев

~ 3×10^{42} эрг/с в гамма диапазоне

~ 1×10^{42} эрг/с в оптическом диапазоне

Параметры модели ЗРАР

$$M_{Ni}, M_{Ejecta}, V_e$$

$$M_{Ni} \sim 0.6 M_{Sun} [\pm 0.1]$$

$$M_{Ejecta} \sim 1.3 M_{Sun} [\pm 0.7]$$

$$V_e \sim 3000 \text{ km/s} [\pm 1000]$$

SN2014J и «канонические» модели

Model	$M_{\text{Ni}}, M_{\text{Sun}}$	$M_{\text{Ej}}, M_{\text{Sun}}$	$E_{\text{K}}, 10^{51} \text{ erg}$	$\Delta\chi^2$
W7 ²	0.59	1.38	1.24	54.4
DDT1p1	0.54	1.36	1.29	52.5
DD4 ³⁰	0.61	1.39	1.24	52.0
DDT1p4	0.66	1.36	1.35	51.9
3PAR, best-fitting	0.56	1.20	1.3	50.5
3PAR, fiducial	0.70	1.38	1.3	49.3
DDT1p4halo	0.62	1.55	1.3	49.1
HED6 ³⁰	0.26	0.77	0.72	38.2
DETO ²⁹	1.16	1.38	1.44	12.1

Nomoto+, 1984; Woosley & Weaver, 1991; Hoefflich & Khokhlov, 1996; Bravo+, 2014

Supernova seen through γ -ray eyes

Observations of γ -ray photons from a type Ia supernova indicate that stellar explosions of this kind get their energy from sudden thermonuclear fusion in the progenitor star. [SEE LETTER P.406](#)

ROBERT P. KIRSHNER

... ..

... ..

Upsetting the conventional wisdom is always a joy in science. You can get prizes for that. But there is also a deep pleasure in showing decisive evidence on an important physical idea that has been used without proof for decades. The INTEGRAL data establish the thermonuclear explosion mechanism for type Ia supernovae. It is a wonderful result. ■

Уширение линий за счет эффекта Доплера (возможность измерить скорость разлета)

Главные результаты

- ✓ SNIa = Термоядерный взрыв
- ✓ Гамма-линии ^{56}Co (847 и 1238 кэВ)
- ✓ $0.6 \pm 0.1 M_{\text{sun}}$ радиоактивного ^{56}Ni
- ✓ Скорость ~ 10000 км/с $\rightarrow$ Энергия на нуклон ~ 0.6 МэВ
- ✓ $M_{\text{ejecta}} \sim 1.3 M_{\text{sun}}$
- ✓ Аннигиляция позитронов

- DD или SD? Что было на этом месте?
- Структура скоростей/асимметрия?
- Выход позитронов?